


Fever and/or cough



Remarks:

- In all cases of fever and/or cough: assess for TB symptoms and risk factors. If any are present, proceed to the TB diagnostic flow.
- In all fever cases during the rainy season: suspect dengue fever. Perform the Hess test and dengue test, then proceed to the dengue flow chart.
- In all fever cases: if there are chills and rigors or a positive travel history, proceed to malaria management (malaria training will be provided separately).

Amoxicillin dosage for Pneumonia

Age	Weight	Daily dose	125 mg/5 ml susp.	250 mg tablet	500 mg tablet
< 3 months	< 6 kg	125 mg x 3	5 ml x 3	½ tab x 3	–
3 to < 24 months	6 to < 12 kg	250 mg x 3	10 ml x 3	1 tab x 3	–
2 to < 8 years	12 to < 25 kg	500 mg x 3	20 ml x 3	2 tab x 3	1 tab x 3
≥ 8 years and adult	≥ 25 kg	1 g x 3	–	4 tab x 3	2 tab x 3


Paracetamol dose

- Adult – 500mg tds for 5 days
- Child
 - Child under 1 month: 10 mg/kg 3 or 4 times daily (max. 40 mg/kg daily)
 - Child 1 month and over: 15 mg/kg 3 or 4 times daily (max. 60 mg/kg daily)


Antihistamine (if nasal congestion or running nose present)

- Children > 6 years & adult– chlorpheniramine maleate 4 mg HS for 3-5days


TB screening assessment flow chart




Management flow chart for dengue



Laboratory confirmation of Dengue



Management flow chart for malaria



Malaria treatment (*Plasmodium falciparum*)

လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ သာမန်၎င်းကုသရေးလမ်းညွှန်



+

ပီ-ဖယ်စီပါရပ် (*P. falciparum*) သာမန်၎င်းကုသခြင်း ဆေးအညွှန်း

အာတီမီးသား- လူမီဖန်ထရိုင်း ဆေးပြား
 Artemether 20 mg - Lumefantrine 120 mg (Coartem tablets)

အသက်အုပ်စု	ပထမနေ့			ဒုတိယနေ့		တတိယနေ့	
	ပထမ အကြိမ်	ပျိုင်းမာကွင်း (၇.၅ mg ဆေးပြား) ၁ ကြိမ်	ဒုတိယ အကြိမ်	ပထမ အကြိမ်	ဒုတိယ အကြိမ်	ပထမ အကြိမ်	ဒုတိယ အကြိမ်
၆ လ အောက်		မတိုက်ပါ					
၆ လ မှ ၁၁ လ							
၁-၄ နှစ် အထိ							
၅-၉ နှစ် အထိ							
၁၀-၁၄ နှစ် အထိ							
၁၅ နှစ် နှင့် အထက်							

Malaria treatment (Plasmodium vivax/ ovale/ malariae)

အသက်အုပ်စု	<i>P. vivax, P. ovale</i> နှင့် <i>P. malariae</i> * ငှက်ဖျားများကို ကုသခြင်းဆေးအညွှန်း			
	ပထမနေ့		ဒုတိယနေ့	တတိယနေ့
	ကလိုရိုကွင်း (Chloroquine) ၁၅၀ mg ဆေးပြား	ပရိုမက်ကွင်း (၇.၅ mg ဆေးပြား ၁ ကြိမ် * ၁၄ ရက်)	ကလိုရိုကွင်း (Chloroquine) ၁၅၀ mg ဆေးပြား	ကလိုရိုကွင်း (Chloroquine) ၁၅၀ mg ဆေးပြား
၆ လ အောက်		မတိုက်ပါ		
၆ လ မှ ၁၁ လ				
၁-၄ နှစ် အထိ				
၅-၉ နှစ် အထိ				
၁၀-၁၄ နှစ် အထိ				
၁၅ နှစ် နှင့် အထက်				

လေးပုံတစ်ပုံ
 သုံးပုံတစ်ပုံ
 တစ်ခြမ်း

Malaria treatment (Plasmodium falciparum and vivax/ ovale/ malariae)

အသက်အုပ်စု	<i>P.f + P.v</i> ဖိုဒ်အရော (Mixed Infection) ငှက်ဖျားကို ကုသခြင်းဆေးအညွှန်း							
	အာတီမီဆာ-လူမီဖန်ထရိုင်း ဆေးပြား Artemether 20 mg - Lumefantrine 120 mg (Coartem tablets)							
	ပထမနေ့		ဒုတိယနေ့		တတိယနေ့		တတိယနေ့	
အသက်အုပ်စု	ပထမ အကြိမ်	ပရိုမက်ကွင်း (၇.၅ mg ဆေးပြား ၁ ကြိမ် * ၁၄ ရက်)	ဒုတိယ အကြိမ်	ပထမ အကြိမ်	ဒုတိယ အကြိမ်	ပထမ အကြိမ်	ဒုတိယ အကြိမ်	ဒုတိယ အကြိမ်
၆ လ အောက်		မတိုက်ပါ						
၆ လ မှ ၁၁ လ								
၁-၄ နှစ် အထိ								
၅-၉ နှစ် အထိ								
၁၀-၁၄ နှစ် အထိ								
၁၅ နှစ် နှင့် အထက်								

Contraindication for primaquine

- Children under 6 months of age
- Pregnant women or lactating women with children under 6-month-old
- Patients with G6PD deficiency (any age)

Explain the patients to stop primaquine and inform to MD/ PM if any symptoms below appear after taking primaquine

- High color/ dark color urine
- Yellow discoloration of the eye

- Difficult breathing
- Pale lips